


## 1. Les acides et les bases

### a) Définition

Un acide selon Brønsted est une espèce chimique capable de **céder** au moins un **ion hydrogène  $H^+$** .



Exemple :  $CH_3CO_2H(aq) \rightarrow CH_3CO_2^-(aq) + H^+$

Une base selon Brønsted est une espèce chimique capable de **capter** au moins un **ion hydrogène  $H^+$** .



Exemple :  $CH_3CO_2^-(aq) + H^+ \rightarrow CH_3CO_2H(aq)$

**Remarque importante** : Les écritures précédentes ne correspondent pas à des équations de réactions car **l'ion hydrogène  $H^+$**  n'existe pas à l'état libre en solution. Ces écritures sont formelles, elles mettent simplement en évidence le transfert d'un **ion hydrogène  $H^+$** .


### b) Couple acide-base

Deux espèces  $AH$  et  $A^-$  qui, au cours d'une réaction chimique, se transforment l'une en l'autre par gain ou perte d'un proton sont dites conjuguées et forment un couple acide-base  $AH/A^-$ . La demi-équation reliant l'acide et la base est une demi-équation acide-base :



Exemples: L'ion éthanoate  $CH_3COO^-$  est la base conjuguée de l'acide éthanoïque  $CH_3COOH$ .

On peut également écrire un couple acide-base :  $BH^+/B$  et la demi-équation acide-base :



## 2. Quelques couples acide-base

### a) Les couples de l'eau

L'eau appartient à deux couples :


Le couple ion oxonium/eau ( $H_3O^+/H_2O$ ), où l'eau joue le rôle de **base**

Le couple eau/ion hydroxyde ( $H_2O/HO^-$ ), où l'eau joue le rôle d'**acide**

Suivant les espèces chimiques présentes, l'eau se comporte soit comme un acide, soit comme une base : on dit que l'eau est une **espèce amphotère**.


## b) Couple de l'acide carbonique

Le dioxyde de carbone gazeux  $CO_2(g)$  est très soluble dans l'eau. Le dioxyde de carbone solubilisé  $CO_2(aq)$  est alors présent comme acide dans le couple suivant :




Dioxyde de carbone dissous dans l'eau, parfois appelé acide carbonique et noté " $H_2CO_3(aq)$ "

Ion hydrogénocarbonate, parfois appelé ion bicarbonate




## c) Couples des acides carboxyliques

Un acide carboxylique de formule  $RCO_2H(aq)$  cède un ion hydrogène  $H^+$  pour former un ion carboxylate  $RCO_2^-(aq)$




Dans un acide carboxylique, l'atome d'hydrogène **H** est relié à un atome d'oxygène **O**. L'électronégativité de l'oxygène est supérieure à celle de l'hydrogène. Les électrons de la liaison  $O - H$  sont attirés par l'oxygène. **H** quitte la molécule de l'acide en laissant son électron et devient  $H^+$ , l'électron récupéré par l'oxygène permet de former un doublet non-liant.



## d) Couples des amines

Une amine est une espèce chimique dérivée de l'ammoniac  $NH_3$  dont au moins un atome d'hydrogène a été remplacé par un groupe carboné.


Grâce au doublet non-liant porté par l'atome d'azote **N**, les amines sont des espèces capables de capter un ion  $H^+$ , les amines sont donc des **bases**.



Le nom de l'acide conjugué s'obtient en remplaçant le terminaison **amine** par la terminaison **ammonium**.

Exemples :

- Le couple  $NH_4^+(aq)/NH_3(aq)$  , ion ammonium / ammoniac
- Le couple ion méthanammonium/ méthanamine



Méthanamine

Ion méthanammonium

Exercices : 27 à 30 page 46 ; Exercice 45 page 48

### 3. Réactions acide-base

Une transformation chimique acide-base met en jeu deux espèces chimiques appartenant à deux couples acide-base différents : l'acide  $A_1H$  du premier couple cède un ion hydrogène  $H^+$  à la base du second couple  $A_2^-$ .

Une réaction acide-base est modélisée par un transfert d'ion hydrogène  $H^+$ .


Établir l'équation d'une réaction acide-base

1. Identifier les deux couples mis en jeu




2. Repérer dans chaque couple les réactifs de la réaction

3. Ecrire les deux demi-équations acide-base dans le sens de la réaction



4. Additionner les deux demi-équations acide-base et supprimer les espèces qui apparaissent des « deux côtés »




**Exercices : 43 et 44 page 48 ; Exercice 47 page 49 et 50 page 51**

### 4. Réaction des acides et des bases dans l'eau

#### a. Constante d'acidité $K_A$ d'un couple acide/base

La mise en solution d'un acide  $AH$  dans l'eau conduit à un équilibre chimique (l'eau joue le rôle de solvant et le rôle de base) :



La constante d'équilibre associée à cette réaction est appelée **constante d'acidité** du couple  $AH/A^-$ , cette constante est notée  $K_A$ .

$$K_A = \frac{[A^-]_{eq} \times [H_3O^+]_{eq}}{C^0 \times [AH]_{eq}}$$


Pour chaque couple Acide/Base, on associe à la constante d'acidité  $K_A$  (sans unité) la grandeur  $pK_A$  (sans unité) donnée par :

$$pK_A = -\log(K_A)$$

#### b. Produit ionique de l'eau

L'eau est une espèce **amphotère**. Elle est l'acide du couple  $H_2O/HO^-$  et elle la base du couple  $H_3O^+/H_2O$ .

Ainsi l'eau (acide) peut réagir avec l'eau (base) selon la réaction suivante, appelée **autoprotolyse** de l'eau :



La constante d'équilibre associée à cette réaction est appelée **produit ionique de l'eau**, et est notée  $K_e$ .


$$K_e = \frac{[H_3O^+]_{eq} \times [HO^-]_{eq}}{(C^0)^2}$$

On associe à cette réaction la valeur  $pK_e = -\log(K_e)$

Remarque : à 25°C,  $K_e = 10^{-14}$ , soit  $pK_e = 14$

## 5. Force d'un acide et d'une base

La force d'un acide ou d'une base correspond à sa capacité à réagir (à se dissocier) avec l'eau.



### a. Acides forts et bases fortes

Un acide est fort si le  $pK_A \leq 0$  ; une base est considérée comme forte si  $pK_A \geq pK_e$


La réaction d'un acide fort (ou d'une base forte) avec l'eau est totale.

Remarque : la base conjuguée d'un acide fort est une base très faible et l'acide conjugué d'une base forte est un acide très faible.

### b. Acides faibles et bases faibles

Un acide faible (une base faible) ne réagit pas complètement avec l'eau.

Un acide faible est d'autant plus fort que son  $pK_A$  est petit ; une base faible est d'autant plus forte que son  $pK_A$  est élevé.



### c. pH d'une solution

- Solution **d'acide fort** de concentration  $c_A$  :

$$pH = -\log(c_A)$$

- Solution de **base forte** de concentration  $c_B$  :

$$pH = pK_e + \log(c_B)$$

- Solution aqueuse **d'acide ou de base faible** :

$$pH = pK_A + \log \frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}}$$


L'ensemble de ces relations peut se retrouver à l'aide des tableaux d'avancement

Exercices 31 et 33 page 224 ; Exercices 39, 40, 41 et 43 page 225

## 6. Diagrammes d'un couple


### a. Diagramme de distribution

Le **diagramme de distribution** indique les proportions des espèces acide et basique d'un couple en fonction du pH de la solution.



### b. Diagramme de prédominance

Un **diagramme de prédominance** d'un couple est un axe de pH sur lequel sont indiqués les domaines de prédominance de l'acide et de la base. C'est-à-dire les intervalles de pH sur lesquels la concentration de l'un est supérieure à celle de l'autre.




Exercice 36 page 224, exercices 44 et 48 page 226

### c. Cas des acides aminés

Un **acide  $\alpha$ -aminé** est une espèce chimique dont les fonctions chimiques amine  $-NH_2$  et acide carboxylique  $-COOH$  sont portées par un même atome de carbone.


Un **amphion** (ou **switterion**) est un ion qui possède une charge négative et une charge positive. Dans le cas des acides-aminés, un amphion se forme en solution aqueuse par un transfert interne d'un ion hydrogène  $H^+$  entre le groupe carboxyle  $-COOH$  et le groupe amine  $-NH_2$  d'un acide alpha-aminé.



En solution aqueuse, l'amphion est une espèce amphotère.

- L'amphion noté  $H_3N^+ - CHR - COO^-$  est l'acide du couple amphion/anion de la forme  $H_3N^+ - CHR - COO^- / H_2N^+ - CHR - COO^-$ .

### Diagramme de prédominance associé à l'amphion d'un acide alpha-aminé



- L'amphion noté  $H_3N^+ - CHR - COO^-$  est la base du couple cation/amphion de la forme  $H_3N^+ - CHR - COOH/H_3N^+ - CHR - COO^-$ .


Exercice 46 page 226

## 7.Applications

### a. Demi-équivalence d'un titrage

La **demi-équivalence** d'un titrage est atteinte quand on a versé la moitié du volume équivalent. On remarque qu'à la demi-équivalence du titrage, le  $pH$  de la solution est égal au  $pK_A$  du couple du réactif titré.

(Pour s'en convaincre, faire les tableaux d'avancement des titrages)




Exercices 33 et 34 page 135; 44 et 45 page 136 ; 46 page 137

### b. Indicateur coloré

Un **indicateur coloré acido-basique** est un couple acide-base  $AH/A^-$  dont les espèces conjuguées n'ont pas la même teinte. Ainsi, après l'ajout d'un indicateur coloré à une solution incolore, on peut évaluer son pH à partir de la teinte prise par celle-ci.

Lors d'un titrage, on peut utiliser de tels indicateurs colorés. En effet, si la zone de virage d'un indicateur coloré (= pH pour lequel il change de couleur) inclut le pH à l'équivalence, alors on pourra déterminer le volume équivalent au moment du changement de teinte de la solution.

#### Zone sensible d'un indicateur coloré



Exercices 27 page 223 et 48 page 226

### c. Solution tampon

Une **solution tampon** est une solution pour laquelle le  $pH$  varie peu par dilution ou par ajout modéré d'un acide ou d'une base. L'utilisation de solution tampon permet de réguler l'acidité de certains milieux (le sang par exemple).

Une solution tampon est obtenue en réalisant un mélange quasiment équimolaire d'un acide faible ( $AH$ ) et de sa base conjuguée ( $A^-$ ). Ainsi, le  $pH$  d'une telle solution est :

$$pH = pK_A + \log \frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}},$$

$$\text{avec } [A^-]_{eq} = [AH]_{eq} \text{ ; soit } \log \frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}} = \log(1) = 0,$$

$$\text{ainsi } pH = pK_A$$

Exercices 51 page 227 et 56 page 228